CONSEJO DENTISTAS
ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE DENTISTAS DE ESPAÑA

ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID-19

(Ministerio de Sanidad, actualizado 10 septiembre 2020)

AMBITO LABORAL

Incluye a todo el personal sanitario en contacto con pacientes

PACIENTE SOSPECHOSO O CONFIRMADO

HA USADO MEDIDAS PROTECCIÓN ADECUADAS

NO se considera contacto estrecho

CONTINUAR CON ACTIVIDAD NORMAL

NO HA USADO MEDIDAS PROTECCIÓN ADECUADAS

SI se considera contacto estrecho

APLICAR MISMO PROTOCOLO QUE POBLACIÓN GENERAL

AMBITO PRIVADO



CONTACTO ESTRECHO

Recomendación de aislamiento hasta confirmar PCR del sospechoso.

- Si la PCR del sospechoso es negativa, levantar aislamiento.
- Si la PCR del sospechoso es positiva, realizar PCR a los contactos y evaluación por médico de atención primaria

SI EL SANITARIO ES CASO SOSPECHOSO

PCR en primeras 24 horas, aislamiento hasta resultado y valoración médico atención primaria

SI EL SANITARIO ES: CASO CONFIRMADO (sin ingreso hospitalario)

- Aislamiento igual que población general.
- Esperar resolución de síntomas al menos 10 días desde el inicio de los mismos.
- PCR negativa para reincorporarse a su actividad laboral

SI EL SANITARIO ES: CASO CONFIRMADO (con ingreso hospitalario)

- Aislamiento igual que población general.
- Esperar resolución de síntomas al menos 14 días desde el inicio de los mismos.
- PCR negativa para reincorporarse a su actividad laboral